biomnis
BIOLOGIE MÉDICALE SPÉCIALISÉE

Quantiféron-TB GOLD®

MODE D'EMPLOI

ATTENTION, seul ce protocole est valide pour les envois à Biomnis



1 Contenu du kit :

3 tubes spécifiques pour prélèvement sanguin :

- Mitogène = tube violet,
- Antigène TB = tube rouge,
- Témoin négatif = tube gris



2 **Prélever le sang par ponction veineuse.**
Remplir les 3 tubes jusqu'à la marque noire.
Noter que le vide est prévu pour un prélèvement de 1ml et que le tube se remplit lentement.
NB : En cas d'utilisation d'une épi crânienne, purger préalablement la tubulure avec un tube sec.



3 Le délai entre le prélèvement et le traitement pré-analytique doit être le plus court possible (‹ 4h)

Secouer les tubes 10 fois de manière suffisamment vigoureuse pour que toute la surface du tube soit recouverte de sang et solubilise les antigènes fixés sur la paroi.



4 **Immédiatement après l'agitation, incuber les tubes verticalement à 37 °C pendant 16h à 24 heures (non conforme au-delà).**



5 **Après l'incubation, centrifuger les tubes pendant 15 mn.**
(Vérifier que le gel séparateur s'est correctement positionné entre les globules rouges et le plasma).
Ne pas ouvrir ou décanter les tubes.

6 **Conserver et envoyer les tubes à +4 °C.**
(Stabilité 4 semaines à +4°C).
Noter le n° de lot de chacun des tubes sur le bon de demande.

LES TUBES NON INCUBÉS ET/OU NON CENTRIFUGÉS NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

K4P
janvier 2014